

☞ Baccalauréat S Liban 28 mai 2013 ☞

**EXERCICE 1**

**4 points**

**Commun à tous les candidats**

*Cet exercice est un questionnaire à choix multiples. Aucune justification n'est demandée. Pour chacune des questions, une seule des propositions est correcte.*

*Chaque réponse correcte rapporte un point. Une réponse erronée ou une absence de réponse n'ôte pas de point. On notera sur la copie le numéro de la question, suivi de la lettre correspondant à la proposition choisie.*

L'espace est rapporté à un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ .

Les points A, B, C et D ont pour coordonnées respectives A(1 ; -1 ; 2), B(3 ; 3 ; 8), C(-3 ; 5 ; 4) et D(1 ; 2 ; 3).

On note  $\mathcal{D}$  la droite ayant pour représentation paramétrique

$$\begin{cases} x = t+1 \\ y = 2t-1 \\ z = 3t+2 \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

et  $\mathcal{D}'$  la droite ayant pour représentation paramétrique  $\begin{cases} x = k+l \\ y = k+3 \\ z = -k+4 \end{cases}, k \in \mathbb{R}$ .

On note  $\mathcal{P}$  le plan d'équation  $x + y - z + 2 = 0$ .

**Question 1 :**

Proposition a. Les droites  $\mathcal{D}$  et  $\mathcal{D}'$  sont parallèles.

Proposition b. Les droites  $\mathcal{D}$  et  $\mathcal{D}'$  sont coplanaires.

Proposition c. Le point C appartient à la droite  $\mathcal{D}$ .

Proposition d. Les droites  $\mathcal{D}$  et  $\mathcal{D}'$  sont orthogonales.

**Question 2 :**

Proposition a. Le plan  $\mathcal{P}$  contient la droite  $\mathcal{D}$  et est parallèle à la droite  $\mathcal{D}'$ .

Proposition b. Le plan  $\mathcal{P}$  contient la droite  $\mathcal{D}'$  et est parallèle à la droite  $\mathcal{D}$ .

Proposition c. Le plan  $\mathcal{P}$  contient la droite  $\mathcal{D}$  et est orthogonal à la droite  $\mathcal{D}'$ .

Proposition d. Le plan  $\mathcal{P}$  contient les droites  $\mathcal{D}$  et  $\mathcal{D}'$ .

**Question 3 :**

Proposition a. Les points A, D et C sont alignés.

Proposition b. Le triangle ABC est rectangle en A.

Proposition c. Le triangle ABC est équilatéral.

Proposition d. Le point D est le milieu du segment [AB].

**Question 4 :**

On note  $\mathcal{P}'$  le plan contenant la droite  $\mathcal{D}'$  et le point A. Un vecteur normal à ce plan est :

Proposition a.  $\vec{n}(-1 ; 5 ; 4)$

Proposition b.  $\vec{n}(3 ; -1 ; 2)$

Proposition c.  $\vec{n}(1 ; 2 ; 3)$

Proposition d.  $\vec{n}(1 ; 1 ; -1)$

**EXERCICE 2**

**5 points**

**Commun à tous les candidats**

L'entreprise *Fructidoux* fabrique des compotes qu'elle conditionne en petits pots de 50 grammes. Elle souhaite leur attribuer la dénomination « compote allégée ».

La législation impose alors que la teneur en sucre, c'est-à-dire la proportion de sucre dans la compote, soit comprise entre 0,16 et 0,18. On dit dans ce cas que le petit pot de compote est conforme.

L'entreprise possède deux chaînes de fabrication  $F_1$  et  $F_2$ .

*Les parties A et B peuvent être traitées indépendamment*

### Partie A

La chaîne de production  $F_2$  semble plus fiable que la chaîne de production  $F_1$ . Elle est cependant moins rapide.

Ainsi, dans la production totale, 70 % des petits pots proviennent de la chaîne  $F_1$  et 30 % de la chaîne  $F_2$ .

La chaîne  $F_1$  produit 5 % de compotes non conformes et la chaîne  $F_2$  en produit 1 %. On prélève au hasard un petit pot dans la production totale. On considère les événements :

$E$  : « Le petit pot provient de la chaîne  $F_2$  »

$C$  : « Le petit pot est conforme. »

1. Construire un arbre pondéré sur lequel on indiquera les données qui précèdent.
2. Calculer la probabilité de l'évènement : « Le petit pot est conforme et provient de la chaîne de production  $F_1$ . »
3. Déterminer la probabilité de l'évènement  $C$ .
4. Déterminer, à  $10^{-3}$  près, la probabilité de l'évènement  $E$  sachant que l'évènement  $C$  est réalisé.

### Partie B

1. On note  $X$  la variable aléatoire qui, à un petit pot pris au hasard dans la production de la chaîne  $F_1$ , associe sa teneur en sucre.

On suppose que  $X$  suit la loi normale d'espérance  $m_1 = 0,17$  et d'écart-type  $\sigma_1 = 0,006$ .

Dans la suite, on pourra utiliser le tableau ci-dessous.

$\alpha$	$\beta$	$P(\alpha \leq X \leq \beta)$
0,13	0,15	0,000 4
0,14	0,16	0,047 8
0,15	0,17	0,499 6
0,16	0,18	0,904 4
0,17	0,19	0,499 6
0,18	0,20	0,047 8
0,19	0,21	0,000 4

Donner une valeur approchée à  $10^{-4}$  près de la probabilité qu'un petit pot prélevé au hasard dans la production de la chaîne  $F_1$  soit conforme.

2. On note  $Y$  la variable aléatoire qui, à un petit pot pris au hasard dans la production de la chaîne  $F_2$ , associe sa teneur en sucre.

On suppose que  $Y$  suit la loi normale d'espérance  $m_2 = 0,17$  et d'écart-type  $\sigma_2$ .

On suppose de plus que la probabilité qu'un petit pot prélevé au hasard dans la production de la chaîne  $F_2$  soit conforme est égale à 0,99.

Soit  $Z$  la variable aléatoire définie par  $Z = \frac{Y - m_2}{\sigma_2}$ .

- a. Quelle loi la variable aléatoire  $Z$  suit-elle ?
- b. Déterminer, en fonction de  $\sigma_2$  l'intervalle auquel appartient  $Z$  lorsque  $Y$  appartient à l'intervalle  $[0,16; 0,18]$ .

c. En déduire une valeur approchée à  $10^{-3}$  près de  $\sigma_2$ .

On pourra utiliser le tableau donné ci-dessous, dans lequel la variable aléatoire  $Z$  suit la loi normale d'espérance 0 et d'écart-type 1.

$\beta$	$P(-\beta \leq Z \leq \beta)$
2,432 4	0,985
2,457 3	0,986
2,483 8	0,987
2,512 1	0,988
2,542 7	0,989
2,575 8	0,990
2,612 1	0,991
2,652 1	0,992
2,696 8	0,993

### EXERCICE 3

6 points

#### Commun à tous les candidats

Étant donné un nombre réel  $k$ , on considère la fonction  $f_k$  définie sur  $\mathbb{R}$  par

$$f_k(x) = \frac{1}{1 + e^{-kx}}.$$

Le plan est muni d'un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

#### Partie A

Dans cette partie on choisit  $k = 1$ . On a donc, pour tout réel  $x$ ,  $f_1(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$ .

La représentation graphique  $\mathcal{C}_1$  de la fonction  $f_1$  dans le repère  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  est donnée en ANNEXE, à rendre avec la copie.

- Déterminer les limites de  $f_1(x)$  en  $+\infty$  et en  $-\infty$  et interpréter graphiquement les résultats obtenus.
- Démontrer que, pour tout réel  $x$ ,  $f_1(x) = \frac{e^x}{1 + e^x}$ .
- On appelle  $f_1'$  la fonction dérivée de  $f_1$  sur  $\mathbb{R}$ . Calculer, pour tout réel  $x$ ,  $f_1'(x)$ .  
En déduire les variations de la fonction  $f_1$  sur  $\mathbb{R}$ .
- On définit le nombre  $I = \int_0^1 f_1(x) dx$ .  
Montrer que  $I = \ln\left(\frac{1+e}{2}\right)$ . Donner une interprétation graphique de  $I$ .

#### Partie B

Dans cette partie, on choisit  $k = -1$  et on souhaite tracer la courbe  $\mathcal{C}_{-1}$  représentant la fonction  $f_{-1}$ .

Pour tout réel  $x$ , on appelle  $P$  le point de  $\mathcal{C}_1$  d'abscisse  $x$  et  $M$  le point de  $\mathcal{C}_{-1}$  d'abscisse  $x$ .

On note  $K$  le milieu du segment  $[MP]$ .

- Montrer que, pour tout réel  $x$ ,  $f_1(x) + f_{-1}(x) = 1$ .
- En déduire que le point  $K$  appartient à la droite d'équation  $y = \frac{1}{2}$ .
- Tracer la courbe  $\mathcal{C}_{-1}$  sur l'ANNEXE, à rendre avec la copie.
- En déduire l'aire, en unités d'aire, du domaine délimité par les courbes  $\mathcal{C}_1$ ,  $\mathcal{C}_{-1}$  l'axe des ordonnées et la droite d'équation  $x = 1$ .

**Partie C**

Dans cette partie, on ne privilégie pas de valeur particulière du paramètre  $k$ .  
Pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle est vraie ou fausse et justifier la réponse.

1. Quelle que soit la valeur du nombre réel  $k$ , la représentation graphique de la fonction  $f_k$  est strictement comprise entre les droites d'équations  $y = 0$  et  $y = 1$ .
2. Quelle que soit la valeur du réel  $k$ , la fonction  $f_k$  est strictement croissante.
3. Pour tout réel  $k \geq 10$ ,  $f_k\left(\frac{1}{2}\right) \geq 0,99$ .

**EXERCICE 4****5 points****Candidats N'AYANT PAS SUIVI l'enseignement de spécialité**

On considère la suite numérique  $(v_n)$  définie pour tout entier naturel  $n$  par

$$\begin{cases} v_0 = 1 \\ v_{n+1} = \frac{9}{6 - v_n} \end{cases}$$

**Partie A**

1. On souhaite écrire un algorithme affichant, pour un entier naturel  $n$  donné, tous les termes de la suite, du rang 0 au rang  $n$ .  
Parmi les trois algorithmes suivants, un seul convient. Préciser lequel en justifiant la réponse.

Algorithme N° 1	Algorithme N° 2	Algorithme N° 3
<b>Variables :</b> $v$ est un réel $i$ et $n$ sont des entiers naturels	<b>Variables :</b> $v$ est un réel $i$ et $n$ sont des entiers naturels	<b>Variables :</b> $v$ est un réel $i$ et $n$ sont des entiers naturels
<b>Début de l'algorithme :</b> Lire $n$ $v$ prend la valeur 1	<b>Début de l'algorithme :</b> Lire $n$ Pour $i$ variant de 1 à $n$ faire	<b>Début de l'algorithme :</b> Lire $n$ $v$ prend la valeur 1
Pour $i$ variant de 1 à $n$ faire $v$ prend la valeur $\frac{9}{6 - v}$	$v$ prend la valeur 1  Afficher $v$	Pour $i$ variant de 1 à $n$ faire Afficher $v$
Fin pour Afficher $v$ <b>Fin algorithme</b>	$v$ prend la valeur $\frac{9}{6 - v}$ Fin pour <b>Fin algorithme</b>	$v$ prend la valeur $\frac{9}{6 - v}$ Fin pour <b>Fin algorithme</b>

2. Pour  $n = 10$  on obtient l'affichage suivant :

1	1,800	2,143	2,333	2,455	2,538	2,600	2,647	2,684	2,714
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Pour  $n = 100$ , les derniers termes affichés sont :

2,967	2,968	2,968	2,968	2,969	2,969	2,969	2,970	2,970	2,970
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Quelles conjectures peut-on émettre concernant la suite  $(v_n)$  ?

3. a. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel  $n$ ,  $0 < v_n < 3$ .

b. Démontrer que, pour tout entier naturel  $n$ ,  $v_{n+1} - v_n = \frac{(3 - v_n)^2}{6 - v_n}$ .

La suite  $(v_n)$  est-elle monotone ?

c. Démontrer que la suite  $(v_n)$  est convergente.

### Partie B Recherche de la limite de la suite $(v_n)$

On considère la suite  $(w_n)$  définie pour tout  $n$  entier naturel par

$$w_n = \frac{1}{v_n - 3}.$$

- Démontrer que  $(w_n)$  est une suite arithmétique de raison  $-\frac{1}{3}$ .
- En déduire l'expression de  $(w_n)$ , puis celle de  $(v_n)$  en fonction de  $n$ .
- Déterminer la limite de la suite  $(v_n)$ .

### EXERCICE 4

5 points

#### Candidats AYANT SUIVI l'enseignement de spécialité

On considère la suite  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 3$ ,  $u_1 = 8$  et, pour tout  $n$  supérieur ou égal à 0 :

$$u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n.$$

- Calculer  $u_2$  et  $u_3$ .
- Pour tout entier naturel  $n \geq 2$ , on souhaite calculer  $u_n$  à l'aide de l'algorithme suivant :

**Variables :**  $a, b$  et  $c$  sont des nombres réels  
 $i$  et  $n$  sont des nombres entiers naturels supérieurs ou égaux à 2

**Initialisation :**  $a$  prend la valeur 3  
 $b$  prend la valeur 8

**Traitement :** Saisir  $n$   
 Pour  $i$  variant de 2 à  $n$  faire  
     |  $c$  prend la valeur  $a$   
     |  $a$  prend la valeur  $b$   
     |  $b$  prend la valeur ...  
 Fin Pour

**Sortie :** Afficher  $b$

- Recopier la ligne de cet algorithme comportant des pointillés et les compléter.

On obtient avec cet algorithme le tableau de valeurs suivant :

$n$	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$u_n$	4 502	13 378	39 878	119 122	356 342	1 066 978	3 196 838	9 582 322	28 730 582

- Quelle conjecture peut-on émettre concernant la monotonie de la suite  $(u_n)$  ?
- Pour tout entier naturel  $n$ , on note  $C_n$  la matrice colonne  $\begin{pmatrix} u_{n+1} \\ u_n \end{pmatrix}$ .  
 On note  $A$  la matrice carrée d'ordre 2 telle que, pour tout entier naturel  $n$ ,  
 $C_{n+1} = AC_n$ .  
 Déterminer  $A$  et prouver que, pour tout entier naturel  $n$ ,  $C_n = A^n C_0$ .

4. Soient  $P = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$  et  $Q = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$ .

Calculer  $QP$ .

On admet que  $A = PDQ$ .

Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel non nul  $n$ ,  $A^n = PD^nQ$ .

5. À l'aide des questions précédentes, on peut établir le résultat suivant, que l'on admet.

Pour tout entier naturel non nul  $n$ ,

$$A^n = \begin{pmatrix} -2^{n+1} + 3^{n+1} & 3 \times 2^{n+1} - 2 \times 3^{n+1} \\ -2^n + 3^n & 3 \times 2^n - 2 \times 3^n \end{pmatrix}.$$

En déduire une expression de  $u_n$  en fonction de  $n$ .

La suite  $(u_n)$  a-t-elle une limite ?

## ANNEXE de l'EXERCICE 3, à rendre avec la copie

Représentation graphique  $\mathcal{C}_1$  de la fonction  $f_1$ 