

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

SESSION 2014

MATHÉMATIQUES

SÉRIE S

Candidats n'ayant pas suivi l'enseignement de spécialité

Durée de l'épreuve : 4 heures – Coefficient : 7

Ce sujet comporte 7 pages numérotées de 1/7 à 7/7.

L'annexe, page 7/7, est à rendre avec la copie.

L'usage des calculatrices est autorisé selon les termes de la circulaire
n°99-186 du 16 novembre 1999.

*_*_*_*

Le candidat doit traiter les quatre exercices.

*Il est rappelé que la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront
pour une part importante dans l'appréciation des copies.*

Dans l'ensemble du sujet, et pour chaque question, toute trace de recherche même incomplète, ou d'initiative même non fructueuse, sera prise en compte dans l'évaluation.

Exercice 1 (4 points)

Commun à tous les candidats

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples comportant quatre questions indépendantes. Pour chaque question, une seule des quatre affirmations proposées est exacte.

Le candidat indiquera sur sa copie le numéro de la question et la lettre correspondant à l'affirmation exacte. Aucune justification n'est demandée. Une réponse exacte rapporte un point ; une réponse fautive ou une absence de réponse ne rapporte ni n'enlève de point.

Question 1

Dans un hypermarché, 75 % des clients sont des femmes. Une femme sur cinq achète un article au rayon bricolage, alors que sept hommes sur dix le font.

Une personne, choisie au hasard, a fait un achat au rayon bricolage.

La probabilité que cette personne soit une femme a pour valeur arrondie au millième :

- a. 0,750 b. 0,150 c. 0,462 d. 0,700

Question 2

Dans cet hypermarché, un modèle d'ordinateur est en promotion. Une étude statistique a permis d'établir que, chaque fois qu'un client s'intéresse à ce modèle, la probabilité qu'il l'achète est égale à 0,3. On considère un échantillon aléatoire de dix clients qui se sont intéressés à ce modèle.

La probabilité qu'exactement trois d'entre eux aient acheté un ordinateur de ce modèle a pour valeur arrondie au millième :

- a. 0,900 b. 0,092 c. 0,002 d. 0,267

Question 3

Cet hypermarché vend des téléviseurs dont la durée de vie, exprimée en année, peut être modélisée par une variable aléatoire réelle qui suit une loi exponentielle de paramètre λ . La durée de vie moyenne d'un téléviseur est de huit ans, ce qui se traduit par : $\lambda = \frac{1}{8}$.

La probabilité qu'un téléviseur pris au hasard fonctionne encore au bout de six ans a pour valeur arrondie au millième :

- a. 0,750 b. 0,250 c. 0,472 d. 0,528

Question 4

Cet hypermarché vend des baguettes de pain dont la masse, exprimée en gramme, est une variable aléatoire réelle qui suit une loi normale de moyenne 200 g. La probabilité que la masse d'une baguette soit comprise entre 184 g et 216 g est égale à 0,954.

La probabilité qu'une baguette prise au hasard ait une masse inférieure à 192 g a pour valeur arrondie au centième :

- a. 0,16 b. 0,32 c. 0,84 d. 0,48

Exercice 2 (4 points)

Commun à tous les candidats

On définit, pour tout entier naturel n , les nombres complexes z_n par :

$$\begin{cases} z_0 = 16 \\ z_{n+1} = \frac{1+i}{2} z_n, \text{ pour tout entier naturel } n. \end{cases}$$

On note r_n le module du nombre complexe z_n : $r_n = |z_n|$.

Dans le plan muni d'un repère orthonormé direct d'origine O , on considère les points A_n d'affixes z_n .

- Calculer z_1 , z_2 et z_3 .
 - Placer les points A_1 et A_2 sur le graphique de l'annexe, à rendre avec la copie.
 - Écrire le nombre complexe $\frac{1+i}{2}$ sous forme trigonométrique.
 - Démontrer que le triangle OA_0A_1 est isocèle rectangle en A_1 .
- Démontrer que la suite (r_n) est géométrique, de raison $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

La suite (r_n) est-elle convergente ?

Interpréter géométriquement le résultat précédent.

On note L_n la longueur de la ligne brisée qui relie le point A_0 au point A_n en passant successivement par les points A_1 , A_2 , A_3 , etc.

$$\text{Ainsi } L_n = \sum_{i=0}^{i=n-1} A_i A_{i+1} = A_0 A_1 + A_1 A_2 + \dots + A_{n-1} A_n.$$

- Démontrer que, pour tout entier naturel n : $A_n A_{n+1} = r_{n+1}$.
 - Donner une expression de L_n en fonction de n .
 - Déterminer la limite éventuelle de la suite (L_n) .

Exercice 3 (7 points)

Commun à tous les candidats

Les parties A et B sont indépendantes.

Une image numérique en noir et blanc est composée de petits carrés (pixels) dont la couleur va du blanc au noir en passant par toutes les nuances de gris. Chaque nuance est codée par un réel x de la façon suivante :

- $x = 0$ pour le blanc ;
- $x = 1$ pour le noir ;
- $x = 0,01$; $x = 0,02$ et ainsi de suite jusqu'à $x = 0,99$ par pas de 0,01 pour toutes les nuances intermédiaires (du clair au foncé).

L'image A, ci-après, est composée de quatre pixels et donne un échantillon de ces nuances avec leurs codes.

Un logiciel de retouche d'image utilise des fonctions numériques dites « fonctions de retouche ».

Une fonction f définie sur l'intervalle $[0;1]$ est dite « fonction de retouche » si elle possède les quatre propriétés suivantes :

- $f(0) = 0$;
- $f(1) = 1$;
- f est continue sur l'intervalle $[0;1]$;
- f est croissante sur l'intervalle $[0;1]$.

Une nuance codée x est dite assombrie par la fonction f si $f(x) > x$, et éclaircie si $f(x) < x$.

Ainsi, si $f(x) = x^2$, un pixel de nuance codée 0,2 prendra la nuance codée $0,2^2 = 0,04$.
L'image A sera transformée en l'image B ci-dessous.

Si $f(x) = \sqrt{x}$, la nuance codée 0,2 prendra la nuance codée $\sqrt{0,2} \approx 0,45$.
L'image A sera transformée en l'image C ci-dessous.

0,20	0,40
0,60	0,80

Image A

0,04	0,16
0,36	0,64

Image B

0,45	0,63
0,77	0,89

Image C

Partie A

1. On considère la fonction f_1 définie sur l'intervalle $[0;1]$ par : $f_1(x) = 4x^3 - 6x^2 + 3x$.
 - a) Démontrer que la fonction f_1 est une fonction de retouche.
 - b) Résoudre graphiquement l'inéquation $f_1(x) \leq x$, à l'aide du graphique donné en **annexe**, à **rendre avec la copie**, en faisant apparaître les pointillés utiles.
Interpréter ce résultat en termes d'éclaircissement ou d'assombrissement.

2. On considère la fonction f_2 définie sur l'intervalle $[0;1]$ par : $f_2(x) = \ln(1 + (e-1)x)$.
On admet que f_2 est une fonction de retouche.
On définit sur l'intervalle $[0;1]$ la fonction g par : $g(x) = f_2(x) - x$.
 - a) Établir que, pour tout x de l'intervalle $[0;1]$: $g'(x) = \frac{(e-2) - (e-1)x}{1 + (e-1)x}$.
 - b) Déterminer les variations de la fonction g sur l'intervalle $[0;1]$.
Démontrer que la fonction g admet un maximum en $\frac{e-2}{e-1}$, maximum dont la valeur arrondie au centième est 0,12.
 - c) Établir que l'équation $g(x) = 0,05$ admet sur l'intervalle $[0;1]$ deux solutions α et β , avec $\alpha < \beta$.
On admettra que : $0,08 < \alpha < 0,09$ et que : $0,85 < \beta < 0,86$.

Partie B

On remarque qu'une modification de nuance n'est perceptible visuellement que si la valeur absolue de l'écart entre le code de la nuance initiale et le code de la nuance modifiée est supérieure ou égale à 0,05.

1. Dans l'algorithme décrit ci-dessous, f désigne une fonction de retouche. Quel est le rôle de cet algorithme ?

Variabes : x (nuance initiale)
 y (nuance retouchée)
 E (écart)
 c (compteur)
 k

Initialisation : c prend la valeur 0

Traitement : Pour k allant de 0 à 100, faire

x prend la valeur $\frac{k}{100}$

y prend la valeur $f(x)$

E prend la valeur $|y - x|$

Si $E \geq 0,05$, faire

c prend la valeur $c + 1$

Fin si

Fin pour

Sortie : Afficher c

2. Quelle valeur affichera cet algorithme si on l'applique à la fonction f_2 définie dans la deuxième question de la **partie A** ?

Partie C

Dans cette partie, on s'intéresse à des fonctions de retouche f dont l'effet est d'éclaircir l'image dans sa globalité, c'est-à-dire telles que, pour tout réel x de l'intervalle $[0;1]$, $f(x) \leq x$.


On décide de mesurer l'éclaircissement global de l'image en calculant l'aire A_f de la portion de plan comprise entre l'axe des abscisses, la courbe représentative de la fonction f , et les droites d'équations respectives $x = 0$ et $x = 1$.

Entre deux fonctions, celle qui aura pour effet d'éclaircir le plus l'image sera celle correspondant à la plus petite aire.

On désire comparer l'effet des deux fonctions suivantes, dont on admet qu'elles sont des fonctions de retouche :

$$f_3(x) = x e^{(x^2-1)} \qquad f_4(x) = 4x - 15 + \frac{60}{x+4}.$$

1. a) Calculer A_{f_3} .
 b) Calculer A_{f_4} .
2. De ces deux fonctions, laquelle a pour effet d'éclaircir le plus l'image ?



Exercice 4 (5 points)

Candidats n'ayant pas choisi l'enseignement de spécialité


Dans l'espace muni d'un repère orthonormé, on considère les points :

$$A(1;2;7), \quad B(2;0;2), \quad C(3;1;3), \quad D(3;-6;1) \quad \text{et} \quad E(4;-8;-4).$$

1. Montrer que les points A, B et C ne sont pas alignés.
2. Soit $\vec{u}(1, b, c)$ un vecteur de l'espace, où b et c désignent deux nombres réels.
 - a) Déterminer les valeurs de b et c telles que \vec{u} soit un vecteur normal au plan (ABC).
 - b) En déduire qu'une équation cartésienne du plan (ABC) est : $x - 2y + z - 4 = 0$.
 - c) Le point D appartient-il au plan (ABC) ?
3. On considère la droite \mathcal{D} de l'espace dont une représentation paramétrique est :
$$\begin{cases} x = 2t + 3 \\ y = -4t + 5 \\ z = 2t - 1 \end{cases} \quad \text{où } t \text{ est un nombre réel.}$$
 - a) La droite \mathcal{D} est-elle orthogonale au plan (ABC) ?
 - b) Déterminer les coordonnées du point H, intersection de la droite \mathcal{D} et du plan (ABC).
4. Étudier la position de la droite (DE) par rapport au plan (ABC).

Annexe à rendre avec la copie

Annexe relative à l'exercice 2



Annexe relative à l'exercice 3

Courbe représentative de la fonction f_1

