

## Formulaire de trigonométrie .


Une lecture efficace du cercle trigonométrique permet de retrouver les relations suivantes :

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin(x)$$
$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos(x)$$

$$\frac{\pi}{2} + x$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin(x)$$
$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos(x)$$

$$\cos(\pi - x) = -\cos(x)$$
$$\sin(\pi - x) = \sin(x)$$



$$\cos(\pi + x) = -\cos(x)$$
$$\sin(\pi + x) = -\sin(x)$$

$$\cos(-x) = \cos(x)$$
$$\sin(-x) = -\sin(x)$$

### Relations entre cos, sin et tan

$$\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$$

$$1 + \tan^2(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$$

### Formules d'addition

$$\cos(a - b) = \cos(a) \cos(b) + \sin(a) \sin(b)$$

$$\cos(a + b) = \cos(a) \cos(b) - \sin(a) \sin(b)$$

$$\sin(a - b) = \sin(a) \cos(b) - \cos(a) \sin(b)$$

$$\sin(a + b) = \sin(a) \cos(b) + \cos(a) \sin(b)$$

$$\tan(a - b) = \frac{\tan(a) - \tan(b)}{1 + \tan(a) \tan(b)}$$

$$\tan(a + b) = \frac{\tan(a) + \tan(b)}{1 - \tan(a) \tan(b)}$$

## Formules de duplication

$$\cos(2a) = \cos^2(a) - \sin^2(a) = 2\cos^2(a) - 1 = 1 - 2\sin^2(a) \quad \sin(2a) = 2\sin(a)\cos(a) \quad \tan(2a) = \frac{2\tan(a)}{1-\tan^2(a)}$$

Extensions :  $\cos(3a) = 4\cos^3(a) - 3\cos(a)$        $\sin(3a) = 3\sin(a) - 4\sin^3(a)$        $\tan(3a) = \frac{3\tan(a)-\tan^3(a)}{1-3\tan^2(a)}$

Au delà, utiliser la formule de Moivre.

## Formules de linéarisation


$$\cos^2(a) = \frac{1 + \cos(2a)}{2} \quad \sin^2(a) = \frac{1 - \cos(2a)}{2} \quad \tan^2(a) = \frac{1 - \cos(2a)}{1 + \cos(2a)}$$

Extensions :  $\cos^3(a) = \frac{\cos(3a) + 3\cos(a)}{4}$        $\sin^3(a) = \frac{-\sin(3a) + 3\sin(a)}{4}$        $\tan^3(a) = \frac{-\sin(3a) + 3\sin(a)}{\cos(3a) + 3\cos(a)}$

Au delà, utiliser les formules d'Euler. Les formules d'Euler permettent également de montrer que :

$$\begin{aligned} \cos(a)\cos(b) &= \frac{1}{2} [\cos(a-b) + \cos(a+b)] & \cos(a)\sin(b) &= \frac{1}{2} [\sin(a+b) - \sin(a-b)] & \sin(a)\sin(b) &= \frac{1}{2} [\cos(a-b) - \cos(a+b)] \\ \cos(p) + \cos(q) &= 2 \cos\left(\frac{p+q}{2}\right) \cos\left(\frac{p-q}{2}\right) & \cos(p) - \cos(q) &= -2 \sin\left(\frac{p+q}{2}\right) \sin\left(\frac{p-q}{2}\right) \\ \sin(p) + \sin(q) &= 2 \sin\left(\frac{p+q}{2}\right) \cos\left(\frac{p-q}{2}\right) & \sin(p) - \sin(q) &= 2 \sin\left(\frac{p-q}{2}\right) \cos\left(\frac{p+q}{2}\right) \end{aligned}$$


## Résolution d'équations trigonométriques



$$U = \pi - V \quad \cos(U) = \cos(V) \Leftrightarrow (U = V [2\pi] \text{ ou } U = -V [2\pi])$$

$$\sin(U) = \sin(V) \Leftrightarrow (U = V [2\pi] \text{ ou } U = \pi - V [2\pi])$$

$$\tan(U) = \tan(V) \Leftrightarrow U = V [\pi]$$



## Expression du cosinus, sinus et tangente en fonction de la tangente de l'angle moitié

Si  $t = \tan\left(\frac{a}{2}\right)$ , on a :       $\cos(a) = \frac{1-t^2}{1+t^2}$  ;     $\sin(a) = \frac{2t}{1+t^2}$  ;     $\tan(a) = \frac{2t}{1-t^2}$