

Bac maths 2024 aux centres étrangers

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL
ÉPREUVE D'ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ
Centres étrangers - SESSION 2024
MATHÉMATIQUES
Jour 2
Durée de l'épreuve : 4 heures

L'usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L'usage de la calculatrice sans mémoire « type collège » est autorisé.

La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements seront prises en compte dans l'appréciation de la copie.

Les traces de recherche, même incomplètes ou infructueuses, seront valorisées.

Exercice 1 (5 points)

Un sac opaque contient huit jetons numérotés de 1 à 8, indiscernables au toucher.

À trois reprises, un joueur pioche un jeton dans ce sac, note son numéro, puis le remet dans le sac.

Dans ce contexte, on appelle « tirage » la liste ordonnée des trois numéros obtenus.

Par exemple, si le joueur pioche le jeton numéro 4, puis le jeton numéro 5, puis le jeton numéro 1, alors le tirage correspondant est (4 ; 5 ; 1).

1. Déterminer le nombre de tirages possibles.
2. a. Déterminer le nombre de tirages sans répétition de numéro.
b. En déduire le nombre de tirages contenant au moins une répétition de numéro.

On note X_1 la variable aléatoire égale au numéro du premier jeton pioché, X_2 celle égale au numéro du deuxième jeton pioché et X_3 celle égale au numéro du troisième jeton pioché.

Puisqu'il s'agit d'un tirage avec remise, les variables aléatoires X_1 , X_2 et X_3 sont indépendantes et suivent la même loi de probabilité.

3. Établir la loi de probabilité de la variable aléatoire X_1 .

4. Déterminer l'espérance de la variable aléatoire X_1 .

On note $S = X_1 + X_2 + X_3$ la variable aléatoire égale à la somme des numéros des trois

jetons piochés.

5. Déterminer l'espérance de la variable aléatoire S .

6. Déterminer $P(S = 24)$.

7. Si un joueur obtient une somme supérieure ou égale à 22, alors il gagne un lot.

a. Justifier qu'il existe exactement 10 tirages permettant de gagner un lot.

b. En déduire la probabilité de gagner un lot.

Exercice 2 (6 points)

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $]-\infty; 1[$ par $f(x) = \frac{e^x}{x-1}$.

On admet que la fonction f est dérivable sur l'intervalle $]-\infty; 1[$.

On appelle C_f sa courbe représentative dans un repère.

1. a. Déterminer la limite de la fonction f en 1.

b. En déduire une interprétation graphique.

2. Déterminer la limite de la fonction f en $-\infty$.

3. a. Montrer que pour tout réel x de l'intervalle $]-\infty; 1[$, on a $f'(x) = \frac{(x-2)e^x}{(x-1)^2}$.

b. Dresser, en justifiant, le tableau de variations de la fonction f sur l'intervalle $]-\infty; 1[$.

4. On admet que pour tout réel x de l'intervalle $]-\infty; 1[$, on a $f''(x) = \frac{(x^2-4x+5)e^x}{(x-1)^3}$.

a. Étudier la convexité de la fonction f sur l'intervalle $]-\infty; 1[$.

b. Déterminer l'équation réduite de la tangente T à la courbe C_f au point d'abscisse 0.

c. En déduire que, pour tout réel x de l'intervalle $]-\infty; 1[$, on a :

$$e^x \geq (-2x - 1)(x - 1).$$


5. a. Justifier que l'équation $f(x) = -2$ admet une unique solution α sur l'intervalle $]-\infty; 1[$.

b. À l'aide de la calculatrice, déterminer un encadrement de α d'amplitude 10^{-2} .

Exercice 3 (5 points)

Le cube $ABCDEFGH$ a pour arête 1 cm.

Le point est le milieu du segment $[]$ et le point est le milieu du segment $[]$.



On se place dans le repère orthonormé $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$.

1. Donner les coordonnées des points et .
2. Montrer que le vecteur $\overrightarrow{EJ}$ est normal au plan (FHI) .
3. Montrer qu'une équation cartésienne du plan (FHI) est $-2x - 2y + z + 1 = 0$.
4. Déterminer une représentation paramétrique de la droite (EJ) .
5. a. On note K le projeté orthogonal du point E sur le plan (FHI) .
Calculer ses coordonnées.
- b. Montrer que le volume de la pyramide $EFHI$ est $\frac{1}{6} \text{ cm}^3$.

On pourra utiliser le point L , milieu du segment $[EF]$. On admet que ce point est le projeté orthogonal du point I sur le plan (EFH) .

- c. Dédire des deux questions précédentes l'aire du triangle FHI .

Exercice 4 (4 points)

Partie A

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $[0; +\infty[$ par $f(x) = \sqrt{x+1}$.
On admet que cette fonction est dérivable sur ce même intervalle.

1. Démontrer que la fonction f est croissante sur l'intervalle $[0; +\infty[$.
2. Démontrer que pour tout nombre réel x appartenant à l'intervalle $[0; +\infty[$:

$$f(x) - x = \frac{-x^2 + x + 1}{\sqrt{x+1} + x}$$
3. En déduire que sur l'intervalle $[0; +\infty[$ l'équation $f(x) = x$ admet pour unique solution :

$$l = \frac{1+\sqrt{5}}{2}.$$

Partie B

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 5$ et pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = f(u_n)$ où f est la fonction étudiée dans la partie A.

On admet que la suite de terme général u_n est bien définie pour tout entier naturel n .

1. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n , on a $1 \leq u_{n+1} \leq u_n$.
2. En déduire que la suite (u_n) converge.
3. Démontrer que la suite (u_n) converge vers $l = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$.
4. On considère le script Python ci-dessous :

```
def seuil():  
    n=0  
    u=0.1  
    while ln(2) - u ... 0.0001:  
        n=n+1  
        u=...  
    return (u,n)
```

On rappelle que la commande `abs(x)` renvoie la valeur absolue de x .

- a. Donner la valeur renvoyée par `seuil(2)`.
- b. La valeur renvoyée par `seuil(4)` est 9.

Interpréter cette valeur dans le contexte de l'exercice



[Consulter le corrigé](#)