

Exercice 1

(A) 1) Dans ce cas, $\min(x) = x_1$ et $\max(x) = x_2$

$$x_2 - x_1 = 0,004202$$

$x_2 - x_1 \geq 0,00392$ donc le programme demande un 3^e dosage x_3 .

2) On calcule l'écart-type σ de la série fournie par x_1 , x_2 et x_3 .

On trouve $\sigma \approx 0,002143$

Comme $\sigma \leq 0,00462$, alors on affecte à m la valeur de \bar{x} , la moyenne de la série : $m = \frac{x_1 + x_2 + x_3}{3} = \underline{0,2268}$, qui sera

la valeur renvoyée par le programme.

(B) 1) a) On n'effectue que 2 dosages lorsque l'écart entre ceux-ci est faible, c'est à dire inférieur à 0,00392.

b) Si l'écart entre les 2 dosages est faible, on prend comme valeur du dosage la moyenne des 2.

2) Lorsque les 2 dosages sont trop différents (écart trop grand), alors on en demande un 3^e. Dans ce cas, si l'écart-type est jugé trop grand (si $\sigma > 0,00462$), alors les dosages sont trop dispersés autour de \bar{x} , qui n'a donc plus une signification satisfaisante. C'est dans ce cas que le résultat final est la médiane des 3 dosages, alors préférable à la moyenne.

3) On ordonne les 3 valeurs, et la médiane est alors la 2^{ème}.

Exercice 2

1) Comme $A \in \mathcal{C}$, alors $f(2) = 1$, et donc $2a + b + \frac{c}{2} = 1$

Comme la tangente en A à \mathcal{C} est horizontale, alors $f'(2) = 0$.

Or pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, $f'(x) = a - \frac{c}{x^2}$. Donc $a - \frac{c}{4} = 0$

D'après les données, la tangente à \mathcal{C} au point d'abscisse 1 a le même coefficient directeur que la droite d'équation $y = \frac{3}{2}x + 2$, soit $\frac{3}{2}$, et donc $f'(1) = \frac{3}{2}$, d'où $a - \frac{c}{1^2} = \frac{3}{2}$ soit $a - c = \frac{3}{2}$

On résout donc le système :

$$\begin{cases} 2a + b + \frac{c}{2} = 1 & (L_1) \\ a - \frac{c}{4} = 0 & (L_2) \\ a - c = \frac{3}{2} & (L_3) \end{cases}$$

$$(L_2) - (L_3) \text{ donne } -\frac{c}{4} + c = -\frac{3}{2}$$

$$\text{soit } \frac{3}{4}c = -\frac{3}{2}$$

$$\text{d'où } c = -\frac{3}{2} \times \frac{4}{3} = -2$$

$$\boxed{c = -2}$$

On remplace dans (L3): $a - (-2) = \frac{3}{2}$, d'où $a = -\frac{1}{2}$

On remplace dans (L1): $2 \times (-\frac{1}{2}) + b + \frac{-2}{2} = 1$

$$-1 + b - 1 = 1 \quad \text{d'où} \quad b = 3$$

Donc $\mathcal{P} = (-\frac{1}{2}; 3; -2)$ ce qui donne

$$\underline{f(x) = -\frac{1}{2}x + 3 - \frac{2}{x}}$$

2) d passe par exemple par les points $(0; 3)$ et $(6; 0)$.

3) on étudie le signe de la différence $D(x)$:

$$D(x) = f(x) - \left(-\frac{1}{2}x + 3\right) = -\frac{1}{2}x + 3 - \frac{2}{x} + \frac{1}{2}x - 3$$

$$D(x) = -\frac{2}{x}$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, $-\frac{2}{x} \neq 0$ et $-\frac{2}{x}$ est du signe

opposé à x , donc:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$D(x)$	$+$	\parallel	$-$

On en déduit que \mathcal{G} est au-dessus de d sur $]-\infty; 0[$
et en-dessous sur $]0; +\infty[$.