


Exercice 1

4,5 pts

1.

- a) On lit $Q_1 = 250$
 b) On lit $Q_3 = 450$
 c) $Q_3 - Q_1 = 450 - 250 = 200$
 d) On lit $Me = 350$.

(2 pts)



2.

valeur	[100;200[[200;300[[300;400[[400;500[[500;600[
Fréquence cumulée croissante	0,2	0,3	0,7	0,8	1
Fréquence	0,2	0,1	0,4	0,1	0,2
Centre des classes	150	250	350	450	550

(1,5 pt)

3. Pour calculer la moyenne, on prend le centre des classes.

$$\bar{x} = 0,2 \times 150 + 0,1 \times 250 + 0,4 \times 350 + 0,1 \times 450 + 0,2 \times 550$$

$$\bar{x} = 350$$

(1 pt)

Exercice 2

5,5 pts

1. On range les 12 températures dans l'ordre croissant :

12 ; 12,4 ; 13,9 ; 14,1 ; 15,1 ; 16,2 ; 16,3 ; 16,7 ; 16,8 ; 17,4 ; 17,7 ; 18,4.

- a) $x_{\max} - x_{\min} = 18,4 - 12 = 6,4$
 L'étendue de la série est 6,4. (0,5 pt)

b) $\bar{x} = \frac{12 + 12,4 + \dots + 18,4}{12} = \frac{187}{12} \approx 15,6$

La température moyenne annuelle est d'environ 15,6 °C. (1 pt)

c) $Me = \frac{6^{\text{ème}} + 7^{\text{ème}} \text{ valeur}}{2} = \frac{16,2 + 16,3}{2} = \boxed{16,25}$ (1 pt)

d) $\frac{12}{4} = 3$ donc $\boxed{Q_1 = 13,9}$ (3^{ème} valeur)
 $\frac{3 \times 12}{4} = 9$ donc $\boxed{Q_3 = 16,8}$ (9^{ème} valeur) (1 pt)

2.

- a) La moyenne de Barcelone est supérieure à celle de Mexico. (0,5pt)
 b) L'étendue pour Mexico est inférieure à celle de Barcelone. (0,5pt)
 c) Pour chaque ville, la médiane est supérieure à 16°C. (0,5pt)
 d) A Mexico, l'intervalle interquartile est [13,9;16,8]. (0,5pt)

1. $f(-3) = 4$ et $g(5) = 0$. (0,5 pt)
2. Les antécédents de 2 par g sont -6 ; 1 et 6. (1 pt)
3. a) Les solutions de l'inéquation $g(x) \geq 4$ sont les abscisses des points de C_g situés au-dessus (ou sur) la droite d'équation $y = 4$. $S = [-3; 0]$. (0,75 pt)
- b) Les solutions de l'inéquation $f(x) < g(x)$ sont les abscisses des points de C_f situés strictement au-dessous de C_g . $S =]-3; 1[\cup]5; 6]$. (0,75 pt)

4. a)

x	-6	-1	4	6
variations de g	2	5	-1	2

(1 pt)

b) $-1 \leq a \leq b \leq 4$.

La fonction g est décroissante sur $[-1; 4]$ donc $g(a) \geq g(b)$. (1 pt)

Exercice 4

Partie A : $f(x) = x^2 - 4x + 32$ sur $[0 ; 4]$

1) Compléter le tableau de valeurs suivant avec un pas de 0,5 sur $[0 ; 4]$

x	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
$f(x)$	32	30,25	29	28,25	28	28,25	29	30,25	32

(0,75 pt)

- 2) Pour visualiser la courbe on peut choisir la fenêtre :
 $x_{\min} = 0 ; x_{\max} = 4, x_{\text{grad}} = 1 ; y_{\min} = 25 ; y_{\max} = 35 ; y_{\text{grad}} = 1$ (0,5 pt)
- 3) Sur $[0 ; 4]$, f semble admettre un minimum de 28 atteint en $x = 2$. (0,75 pt)
- 4) $f(x) - f(2) = x^2 - 4x + 32 - 28 = x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2$
 Pour tout $x \in [0 ; 4]$, $(x - 2)^2 \geq 0$ donc $f(x) - f(2) \geq 0$ donc $f(x) \geq f(2)$.
 Sur $[0 ; 4]$, f admet un minimum de 28 atteint en $x = 2$. (1,5 pt)

Partie B : On s'intéresse à l'aire du polygone IBJKDL notée $A(x)$.

1. $A(x) = \text{aire}(ABCD) - 2\text{aire}(AIL)$

$$A(x) = AB \times AD - 2 \times \frac{1}{2} \times AI \times AL$$

$$A(x) = 8 \times 4 - x(4 - x) \quad (1 \text{ pt})$$

$$A(x) = 32 - 4x + x^2$$

$$A(x) = f(x)$$

2. D'après le A.4. l'aire de IBJKDL est minimale lorsque $x = 2$. (0,5 pt)