

## Devoir commun - mars 2014

*Durée : 3 heures**L'utilisation de la calculatrice est autorisée.*

*Le sujet est composé de 5 exercices indépendants. Tous les exercices doivent être traités.*

*Dans chaque exercice, on peut admettre un résultat précédemment donné dans le texte pour aborder les questions suivantes, à condition de l'indiquer clairement sur la copie.*

*La qualité et la précision de la rédaction seront prises en compte dans l'appréciation des copies. On veillera notamment à justifier tous les résultats avancés.*

**Exercice 1** (5 points)

*Cet exercice est un questionnaire à choix multiple (QCM). Pour chaque question, une seule des quatre réponses proposées est correcte.*

*Une réponse juste rapporte un point ; une réponse fausse ou l'absence de réponse n'apporte pas de point et n'en retire pas.*

**Relevez sur votre copie le numéro de la question ainsi que la lettre correspondant à la réponse choisie. Aucune justification n'est demandée.**

On note  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  dont la courbe représentative ( $C$ ) est la parabole donnée en annexe (dernière page du sujet). Le point  $A(4; 0)$  appartient à la courbe ( $C$ ) et la droite ( $d$ ) est la tangente à la courbe ( $C$ ) au point  $A$ .

1.  $f'(4) =$

a. 0

b. 6

c.  $\frac{1}{6}$

d.  $-\frac{1}{6}$

2. Pour tout réel  $x$  de l'intervalle  $[1; 2]$ ,

a.  $f'(x) \leq 0$

b.  $f'(x) = 0$

c.  $f'(x) \geq 0$

d.  $f'(x) = -4$

3. La fonction  $f$  a pour expression :

a.  $f(x) = (x-1)(x-4)$

b.  $f(x) = 2x^2 - 10x$

c.  $f(x) = -2x^2 + 8$

d.  $f(x) = 2x^2 - 10x + 8$

4. La tangente à la courbe ( $C$ ) au point d'abscisse 2 a pour équation :

a.  $y = 4x - 24$

b.  $y = -2x$

c.  $y = -2x - 4$

d.  $y = -3x + 2$

5. La fonction  $\sqrt{f}$  est

a. croissante sur  $[0; +\infty[$

b. croissante sur  $\mathbb{R}$

c. décroissante sur  $] -\infty; 1]$


d. croissante sur  $[2; 5; +\infty[$

**Exercice 2** (7 points)

On considère la fonction  $f$  définie sur  $[0; 15]$  par

$$f(x) = 2x^3 - 60x^2 + 450x - 500.$$

1. a. Calculer  $f'(x)$ . (0,5 point)
  - b. Étudier le signe de  $f'(x)$  sur  $[0; 15]$ . (1 point)
  - c. En déduire le tableau de variations de  $f$  sur  $[0; 15]$ . (0,5 point)
  - d. On admet que l'équation  $f(x) = 0$  a 2 solutions distinctes dans l'intervalle  $[0; 15]$ .  
Donner des valeurs approchées, à  $10^{-1}$  près, de ces solutions notées  $\alpha$  et  $\beta$ . (1 point)
2. Un fabricant envisage la production de boîtes en forme de pavé droit pour emballer des clous en découpant deux bandes de même largeur dans une feuille de carton **carrée**.  
Le côté de la feuille mesure 30 cm et on désigne par  $x$  la mesure en cm de la largeur des bandes découpées. On admet que  $0 \leq x \leq 15$ .



- a. Calculer le volume de la boîte si  $x = 2$ . (1 point)
  - b. Justifier que le volume  $V(x)$ , en  $\text{cm}^3$ , de la boîte est  $V(x) = (15 - x)(30 - 2x)x$ . (0,5 point)
  - c. Vérifier que le volume  $V(x)$  est égal à  $f(x) + 500$ , où  $f$  est la fonction définie précédemment. (1 point)
  - d. En déduire la valeur de  $x$  pour laquelle le volume de la boîte est maximal. Préciser la valeur du volume maximal. (1 point)
3. Le fabricant veut des boîtes de  $500 \text{ cm}^3$ . Combien a-t-il de possibilités? Justifier la réponse. (0,5 point)

**Exercice 3** (6 points)

Une urne contient  $n$  boules indiscernables au toucher : 5 boules rouges et  $n - 5$  boules noires ( $n$  est un entier supérieur ou égal à 6).

Un joueur tire au hasard successivement et sans remise deux boules de l'urne.

1. Construire un arbre pondéré décrivant cette expérience aléatoire. (1 point)
2. Le joueur gagne 2 euros si les deux boules tirées sont de couleurs différentes et perd 1 euro sinon. On note  $A$  l'événement : «les deux boules tirées sont de couleurs différentes» et  $X$  la variable aléatoire donnant le gain algébrique du joueur.
  - a. Montrer que :  $P(A) = \frac{10n - 50}{n^2 - n}$ . (1,5 point)
  - b. Déterminer la loi de probabilité de  $X$ . (1,5 point)
  - c. Montrer que :  $E(X) = \frac{-n^2 + 31n - 150}{n^2 - n}$ . (1 point)
3. Comment choisir  $n$  pour que le jeu soit équitable? (1 point)

**Exercice 4** (7 points)

$ABC$  est un triangle quelconque.

Le point  $I$  est tel que  $\overrightarrow{BI} = \frac{1}{4}\overrightarrow{BA}$ .


Le point  $J$  est tel que  $\overrightarrow{CJ} = \frac{2}{3}\overrightarrow{CB}$ .

Le point  $K$  est tel que  $\overrightarrow{AK} = \frac{3}{5}\overrightarrow{AC}$ .

On souhaite démontrer que les droites  $(AJ)$ ,  $(BK)$  et  $(CI)$  sont concourantes.

Soit  $E$  le point d'intersection des droites  $(AJ)$  et  $(BK)$ .

On se place dans le repère  $(B; \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BA})$ .



1. a. Donner, sans justification, les coordonnées des points  $B$ ,  $C$ ,  $A$ ,  $I$  et  $J$ . (1 point)
- b. Calculer les coordonnées du point  $K$ . (1 point)

Dans la suite, on admet que les coordonnées de  $K$  sont  $\left(\frac{3}{5}; \frac{2}{5}\right)$ .

2. a. Déterminer une équation cartésienne de la droite  $(AJ)$  et montrer qu'elle peut se mettre sous la forme  $3x + y - 1 = 0$ . (1 point)
  - b. Déterminer une équation cartésienne de la droite  $(BK)$ . (1 point)
  - c. En déduire les coordonnées du point  $E$ . (1,5 point)
3. Démontrer que le point  $E$  appartient à la droite  $(CI)$  et conclure. (1,5 point)

**Exercice 5** (5 points)

Soit la suite  $U$  de terme général  $U_n$  définie pour tout entier naturel  $n$  par :

$$\begin{cases} U_0 = 0 \\ U_{n+1} = U_n + 2(n+1) \end{cases}$$

1. a. Montrer que  $U_1 = 2$  et que  $U_2 = 6$ . Calculer  $U_3$ . (1,5 point)
  - b. A l'aide des résultats précédents, déterminer pour chacune des deux propositions suivantes si elle est vraie ou fausse. Justifier les réponses. (1 point)
- Proposition 1** : « Il existe au moins une valeur de  $n$  pour laquelle  $U_n = n^2 + 1$ . »
- Proposition 2** : « Pour toutes les valeurs de  $n$ , on a  $U_n = n^2 + 1$ . »

2. On considère l'algorithme suivant :

**Début de l'algorithme**

**Entrée** : Saisir  $N$  un entier naturel non nul

**Initialisation** : Affecter à  $P$  la valeur 0

**Traitement** : Pour  $K$  allant de 0 à  $N$  :

Affecter à  $P$  la valeur  $P + K$

Afficher  $P$

Fin Pour

**Fin de l'algorithme**

- a. Faire fonctionner l'algorithme avec  $N = 3$ . Obtient-on à l'affichage les valeurs des quatre premiers termes de la suite  $U$ ? (1,5 point)
- b. Recopier la partie **Traitement** de cet algorithme en la modifiant, de manière à obtenir à l'affichage les valeurs des  $N + 1$  premiers termes de la suite  $U$ . (1 point)

## ANNEXE Exercice 1

